


SIN 10/020903  
6-08 3762  
9418



Eur päisches Patentamt  
European Patent Office  
Office européen des brevets



(11) EP 0 952 453 A1

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:  
27.10.1999 Patentblatt 1999/43

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>: G01N 33/84

**I D S**

(21) Anmeldenummer: 99107620.9

(22) Anmeldetag: 16.04.1999

(84) Benannte Vertragsstaaten:  
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU  
MC NL PT SE  
Benannte Erstreckungsstaaten:  
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 22.04.1998 DE 19817963

(71) Anmelder: Roche Diagnostics GmbH  
68298 Mannheim (DE)

(72) Erfinder: Treiber, Wolfgang  
82362 Weilheim (DE)

(54) **Verfahren und Reagenz zur störungsfreien Bestimmung von Eisen**

(57) Verfahren und Reagenz zur Bestimmung von Eisen in einer biologischen Probe unter Freisetzung des gebundenen Eisens, Reduktion des freigesetzten Eisens zu Fe<sup>2+</sup>, Zugabe einer Farbreagenzlösung und photometrische Messung des gebildeten Farbkomplexes, dadurch gekennzeichnet, daß die Probe mit einer wasserlöslichen EDTA komplexierenden Verbindung, insbesondere einem Indium- und/oder Scandiumsalz versetzt wird.

EP 0 952 453 A1

## Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur störungsfreien Bestimmung von Eisen in biologischen Proben, insbesondere Serum unter Freisetzung des gebundenen Eisen, Reduktion des freigesetzten Eisens zu  $\text{Fe}^{2+}$ , Zugabe einer Farbreagenzlösung und photometrischen Messung des gebildeten Farbkomplexes sowie eine Reagepzienkombination, die insbesondere in Gegenwart höherer Mengen EDTA die störungsfreie Bestimmung von Eisen geeignet ist.

[0002] Eisenstoffwechselstörungen, insbesondere Eisenmangel und Eisenesorptionsstörungen sind vor allem in der weiblichen Bevölkerung weit verbreitet. Der Nachweis von Eisen in Körperflüssigkeiten, insbesondere im Serum gehört daher zu den Standardbestimmungen in der medizinischen Analytik. Eisen wird mit der Nahrung zugeführt und über die Schleimhaut des Darmes aufgenommen. An Transferrin in 3-wertigem Zustand gebunden wird es dann zum Knochenmark transportiert, wo es hauptsächlich in Hämoglobin eingebaut wird. Wird zu wenig Eisen aufgenommen, so kommt es zu anämischen Erscheinungen.

[0003] Die Bestimmung des Eisens im Serum gehört zu den am häufigsten durchgeführten Spurenelementanalysen in der klinischen Diagnostik. Hinsichtlich der Freisetzung des Eisens aus Transferrin sind prinzipiell bei Testvarianten für die Bestimmung bekannt. Zum einen kann die Eisenablösung durch den Zusatz von Detergenzienmischungen (z.B. EP 0 130 537), Guanidiniumchlorid (z.B. EP 0 343 592) oder beispielsweise harnstoffhaltige Denaturierungsmittel (z.B. DE 44 01 754) bei schwach saurem pH-Wert erfolgen. Zum anderen ist Eisen aus Transferrin im stark sauren Medium, insbesondere bei einem pH-Wert von ca. 2.5 oder niedriger ablösbar (Clin. Chem. vol. 26 (1980), 327-331).

[0004] Von Nachteil bei den genannten Testprinzipien ist jedoch, daß diese durch die Gegenwart von EDTA, welches häufig in biologischen Proben, beispielsweise durch entsprechende Vorbehandlungen, enthalten ist, gestört werden. Denn EDTA ist befähigt mit Eisen Komplexe zu bilden und das so gebundene Eisen steht daher nicht zur Bildung eines Farbkomplexes zur Verfügung. Dies kann insbesondere bei EDTA-Plasma als Probenmaterial zu falsch negativen Eisenwerten führen. Darüber hinaus besteht die Gefahr, daß bei entsprechenden Bestimmungen auf Analysenautomaten durch nicht vermeidbare Pipettier- oder Rührvorrichtungen oder durch ungenügend gereinigte Reaktionsgefäße EDTA aus anderen Testflüssigkeiten eingeschleppt wird, wodurch es zu einem verminderten Farbsignal und damit zu einer verminderten Wiederfindung des Eisens kommt.

[0005] Um diesen Nachteil auszuräumen, werden bei der Testvariante, die die Freisetzung des Eisens durch ein geeignetes Denaturierungsmittel erreicht, Zink (II)-Salze zugesetzt. Das eingeschleppte EDTA wird durch  $\text{Zn}^{2+}$ -Ionen maskiert und eine entsprechende Störung durch Reaktionen von EDTA mit  $\text{Fe}^{2+}$ -Ionen vermieden.

[0006] Testvarianten, bei denen die Eisen-Ablösung im stark sauren Medium erfolgt, werden dagegen durch den Zusatz von Zink(II)-Salzen nicht von durch EDTA bewirkten Störungen befreit. Weiterhin hat sich erwiesen, daß in Gegenwart hoher Salzkonzentrationen (ca. 4 mol/l) und/oder hoher Detergenzkonzentrationen (ca. 7%), ein "Herauskriechen" der Reagenzlösung aus den Reagenzflaschen zu beobachten ist und damit beispielsweise zur Zerstörung von Barcode-Etiketten und zur Korrosion von Metallteilen an Analysenautomaten führt.

[0007] Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren bzw. Reagenz zur Bestimmung von Eisen in biologischem Probenmaterial zur Verfügung zu stellen, welches für die Eisen-Freisetzung bei stark sauren pH-Werten und/oder in Lösungen mit hohen Salz- bzw. Detergenzkonzentrationen geeignet ist, wobei in Gegenwart von EDTA keine essentiellen Störungen auftreten bzw. eine dadurch verursachte erniedrigte Wiederfindung von Eisen vermieden wird.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren zur Bestimmung von Eisen in einer biologischen Probe unter Freisetzung des gebundenen Eisens, Reduktion des freigesetzten Eisens zu  $\text{Fe}^{2+}$ . Zugabe einer Farbreagenzlösung und photometrische Messung des gebildeten Farbkomplexes, wo-bei die Probe mit einem wasserlöslichen Salz bestehend aus Metallkationen der III. Haupt- und Nebengruppe (III a+b) des Periodensystems der Elemente, wie beispielsweise Scandium, Indium, Lanthan oder Gallium, in Kontakt gebracht wird. Bevorzugt sind erfindungsgemäß Indiumund/oder Scandiumsalze. Das Gegenion der erfindungsgemäß zuzusetzenden Salze ist unkritisch, solange wasserlösliche Salze resultieren. Insbesondere haben sich hier zwei- oder dreiwertige Kationen sowie folgende Säurereste als geeignet erwiesen: Halogenide, Phosphate, Nitrate, Sulfite und Sulfate, wobei Chloride und Sulfate bevorzugt sind.

[0009] Die Konzentration der erfindungsgemäßen Salze der III. Haupt- bzw. Nebengruppe beträgt in der Reagenzlösung (Endkonzentration im Test) mindestens etwa 0,1 mmol/l, bevorzugt ist ein Bereich zwischen etwa 0,1 und 50 mmol/l, besonders bevorzugt eine Konzentration zwischen etwa 1 und 20 mmol/l.

[0010] Die Freisetzung des gebundenen Eisens kann bei dem erfindungsgemäßen Verfahren prinzipiell gemäß dem Fachmann bekannter Maßnahmen, wie beispielsweise durch den Zusatz geeigneter Detergenzienmischungen (z.B. EP 0 130 537, DE 27 24 757 oder DE 37 29 502) oder eines Denaturierungsmittels wie Guanidiniumchlorid (z.B. EP 0 343 592), bei pH-Werten von in der Regel zwischen 3 und 6 oder - ohne Zusatz einer Eisen freisetzenden Substanz - bei pH-Werten im stark Sauren erfolgen. Bei der Eisenablösung im stark sauren Medium hat sich erfindungsgemäß ein pH-Wert zwischen 0 und 3 als vorteilhaft erwiesen.

[0011] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Probe bzw. das Reagenzgemisch bevorzugt in einem schwach und stark sauren Bereich, besonders bevorzugt im Bereich zwischen pH 0 und pH 6 gehalten. Als Puf-

fersubstanzen sind Verbindungen geeignet, die einen pK-Wert von 2,5 bis 6 aufweisen und Eisen nicht oder nur schwach komplexieren. Geeignet sind beispielsweise Acetat-, Citrat-, Phosphat- oder Succinatpuffer. Eine weitere bevorzugte Variante besteht darin, zur Freisetzung des Eisens zunächst einen sauren pH-Wert einzustellen, besonders bevorzugt pH 3 bis pH 6, und danach auf einen pH-Wert umzupuffern, der mit dem zum Nachweis des Eisens gewählten Farbsystem eine optimale Farbausbeute ergibt. Die hierzu geeigneten pH-Werte sind dem Fachmann an sich bekannt beispielsweise aus Fielding, Methods in Hematology 1 (Iron), 15-49 (1980). Besonders bevorzugt für das erfindungsgemäße Verfahren ist, wenn die Freisetzung des gebundenen Eisen im stark sauren Medium, bevorzugt zwischen pH 0 und 3, erfolgt und eine EDTA-komplexierende Substanz zugesetzt wird. Als EDTA-komplexierende Substanz kommen insbesondere Salze bestehend aus einem zwei- oder dreiwertigen Kation der Gruppen des Periodensystems III a, III b, IV a, VIII und/oder der Lanthaniden, wie beispielsweise Scandium, Indium, Zirkonium, Nickel, Ytterbium und Lutetium in Betracht, wobei Scandium und/oder Indium bevorzugt sind.

[0012] Bevorzugt wird als Puffersubstanz Acetat- oder Citratpuffer eingesetzt. Der Puffer wird bevorzugt mit einer Konzentration von 20 bis 500 mmol/l, insbesondere in einem Bereich von 50 bis 250 mmol/l, verwendet. Ganz besonders bevorzugt ist, wenn die Pufferlösung ca. 200 mmol/l Citronensäure enthält. Die Puffersubstanz kann in der ersten Lösung des erfindungsgemäßen Eisentests; die zudem ein Denaturierungsmittel und gegebenenfalls Fettalkoholpolyglykoether enthalten kann, enthalten sein. Zusätzlich können auch die weiteren Lösungen oder die weitere Lösung des erfindungsgemäßen Eisentests gepuffert sein sowie weitere Hilfsstoffe zur Stabilisierung und/oder zur Eliminierung bzw. Reduzierung nicht gewünschter Reaktionen zugesetzt werden. So können beispielsweise durch den Zusatz von Fettalkoholpolyglykoether bzw. Alkylpolyethylenglykoether Störungen durch lipämische biologische Proben vermieden werden (DE 44 01 754). Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens ist, wenn dem Reagenz Thioharnstoff besonders bevorzugt zwischen 10 und 200 mM zugesetzt wird. Dadurch können insbesondere Kupfer-Interferenzen eliminiert werden.

[0013] Zur Bestimmung des Eisens wird in an sich bekannter Weise der Probelösung ein Reduktionsmittel, wie zum Beispiel Ascorbinsäure, Dithionit oder Hydroxylamin, zugesetzt, um das in 3-wertiger Form vorliegende freigesetzte Eisen in die 2-wertige Form zu reduzieren. Das Reduktionsmittel kann sowohl in der ersten Lösung zusammen mit dem gegebenenfalls verwendeten Denaturierungsmittel als auch in der zweiten Lösung, die weiterhin das für den Nachweis von Eisen geeignete Farbsystem enthält, zugesetzt werden. Bevorzugt wird das Reduktionsmittel jedoch der zweiten Lösung zugesetzt. Des weiteren ist bevorzugt, wenn das Reagenz zusätzlich eine das Reduktionsmittel stabilisierende Substanz, wie ein geeignetes Konservierungsmittel (z.B. Germall II), beinhaltet.

[0014] Farbsysteme zum Nachweis von Eisen sind zum Beispiel beschrieben in der EP 0 228 060, Clin. Biochem. 14 (1981), 311-315 und Clin. Chem. 23 (1979), 234-240. Besonders sind Komplexbildner vom Ferrointyp geeignet, die mit Eisen einen Farbstoff liefern, der photometrisch ausgewertet werden kann. Als geeignete Substanzen sind Bathophenanthrolin und Ferrozin (3'(2'-Pyridyl)-5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-sulfonsäure-dinatriumsalz oder 3'(2'-Pyridyl)-5,6-bis (4-phenylsulfonsäure)-1,2,4-triazin-mononatriumsalz) zu nennen. Die Farbstoffbildung erfolgt dabei proportional zum Eisengehalt der Probe und kann in an sich bekannter Weise photometrisch ausgewertet werden.

[0015] Mit der Erfindung ist es erstmals gelungen, Störungen von EDTA bei der photometrischen Bestimmung von Eisen, insbesondere auch in stark sauren Reagenzlösungen, zu vermeiden.

[0016] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist daher die Verwendung von wasserlöslichen Indium und/oder Scandiumsalzen zur Verhinderung von durch die Anwesenheit von EDTA verursachten Störungen bei der photometrischen Bestimmung von Eisen in einer biologischen Probe.

[0017] Die Überprüfung der Wirksamkeit des Reagenzes zur Vermeidung von EDTA-Störungen kann photometrisch bei einem Probe-/Reagenzverhältnis von 1:5 bis 1:25, bevorzugt von 1:10 bis 1:15 erfolgen. Dabei konnte eine Wiederfindung von Eisen mit lediglich ca. 10% Abweichung erreicht werden. Die Messung erfolgt üblicherweise bei einer Temperatur von ca. 37°C sowie einer Wellenlänge von ca. 570-580 nm und anhand einer Küvette mit einer Schichtdicke von 1 cm gegen die Reagenzlösung als Leerwert.

[0018] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist eine Reagenzienkombination zur Bestimmung von Eisen in einer biologischen Probe, gekennzeichnet durch ein erstes Reagenz, welches zur Freisetzung von gebundenem Eisen befähigt ist und mindestens 0,1 mmol/l eines wasserlöslichen Salzes bestehend aus einem Metallkation der III. Haupt- und/oder Nebengruppe, bevorzugt eines Indium- und/oder Scandiumsalzes enthält und getrennt davon ein zweites Reagenz, enthaltend 0,5 bis 50 mmol/l Farbstoff, und zwar in Form wäßriger Lösungen oder zu deren Herstellung geeigneter Trockengemische vorliegen. Beide Reagenzien oder auch nur das erste Reagenz können zusätzlich 20 bis 500 mmol/l Puffersubstanz enthalten.

[0019] Insbesondere das erste Reagenz kann darüber hinaus weitere Hilfsstoffe enthalten, wie beispielsweise ein zur Vermeidung lipämischer Interferenzen geeignetes Detergenz, bevorzugt sind hierbei etwa 1% bis 10% (w/v) Alkylpolyethylenglykoether (z.B. Genapol X-80: Isotridecylpoly (ethylenglycoether)<sub>n</sub>, n=8), oder zur Eliminierung von durch Kupfer bedingte Interferenzen, wobei 10 bis 200 mM Thioharnstoff bevorzugt sind.

[0020] Das zweite Reagenz kann zusätzlich ein Reduktionsmittel, beispielsweise Ascorbinsäure, Dithionit oder Hydroxylamin, in einer Konzentration von 20 bis 200 mmol/l enthalten. Wahlweise kann das zweite Reagenz zudem

eine das Reduktionsmittel stabilisierende Substanz bzw. Substanzmischung, wie beispielsweise die käuflich zu erwerbenden Substanzen Germall II, Germall 115, Oxaban A oder Oxaban E in einer Konzentration von 0,5 bis 6,0 g/l, bevorzugt von 1 bis 3 g/l enthalten. Außerdem besteht die Möglichkeit, das Reduktionsmittel erst kurz vor der Verwendung dem Flüssigreagenz zuzugeben.

[0021] Die beiden Reagenzien können in Form wäßriger Lösungen oder zu deren Herstellung geeigneter Trockengemische (Lyophilisate) vorliegen.

[0022] Die Reagenzienkombination zeichnet sich darüber hinaus durch eine überraschend hohe Stabilität aus. So hat sich erwiesen, daß das Reagenz nach Lagerung von 24 Stunden bei 42°C bzw. 3 Wochen bei 35°C (entspricht einem Belastungsmodell für 18 Monate Realtime bei 2-8°C) ohne jeglichen Qualitäts- bzw. Aktivitätsverlust für die störungsfreie Bestimmung von Eisen verwendet werden kann.

Erläuterung der Abbildung:

#### Abbildung 1:

[0023] Prozentuale Wiederfindung von Eisen in Gegenwart von 0 bis 10 mg/ml EDTA-Trikaliumsalz; Probe: Humanserumpool ca. 77 µg/dl Eisen; folgende Zusätze: —■— 10 mM Indiumsulfat, —▲— 10 mM Scandiumsulfat, —◆— 20 mM Nickelsulfat, —+— 10 mM Ytterbiumsulfat, —◇— 10 mM Zirkoniumsulfat, —X— 10 mM Lutetiumsulfat; übrige Kurven: ohne bzw. unwirksame Zusätze.

[0024] Die folgenden Beispiele erläutern die Erfindung näher.

#### Beispiel 1

[0025] Zur Eisenbestimmung in Serum werden folgende Reagenzien eingesetzt:

Reagenz: 1:	200 mmol/l	Citronensäure
	100 mmol/l	Thioharnstoff
	7% (w/v)	Alkylpolyethylenglykolether
	10 mmol/l	Indium (III)-chlorid
Reagenz: 2:	150 mmol/l	Natriumascorbat
	6 mmol/l	3'(2'-Pyridyl)-5,6-bis (4-Phenylsulfonsäure)-1,2,3-Triazin-mononatriumsalz

[0026] Die Bestimmungen wurden an einem Hitachi 717-Analysenautomaten, Boehringer Mannheim GmbH, bei einer Meßtemperatur von 37°C durchgeführt. Die Messung erfolgte bei einer Wellenlänge von 570 nm gegen die Referenzwellenlänge 700 nm. Ausgewertet wurde die Differenz aus Meßwellenlänge und Referenzwellenlänge.

[0027] 20 µl einer Serumprobe wurden mit 250 µl Reagenz 1 in eine Küvette pipettiert und nach Mischen bei 37°C inkubiert. Nach 5 Minuten wurde eine erste Extinktionsmessung durchgeführt. Anschließend wurden 50 µl Reagenz 2 zupipettiert, gemischt, weitere 5 Minuten inkubiert und dann eine zweite Extinktionsmessung durchgeführt. Die Auswertung erfolgte durch Differenzbildung der beiden Extinktionswerte.

[0028] In gleicher Weise wurde ein Leerwert mit 0,9%iger Kochsalzlösung als Probe und ein Kalibrator mit bekanntem Eisengehalt analysiert. Aus diesen beiden Proben wurde eine lineare Kalibrationskurve erstellt, an der die bekannten Proben anschließend abgelesen wurden.

Ergebnisse:

[0029] Ein Humanserum wurde mit 3 mg/ml EDTA-K<sub>3</sub> aufgestockt (typische Konzentration eines EDTA-Plasmas) und als Probe eingesetzt. Als Vergleichswert wurde der unaufgestockte Humanserumpool gemessen und die Wiederfindung der aufgestockten Probe in Relation zur unaufgestockten Probe berechnet.


Tabelle 1

Zusatz zu Reagenz 1	Wiederfindung
ohne Zusatz	-2,8%
10 mmol/l Indiumsulfat	89,4%
10 mmol/l Scandiumsulfat	88,9%
10 mmol/l Lutetiumsulfat	8,8%
10 mmol/l Ytterbiumsulfat	22,0%
10 mmol/l Nickelsulfat	79,8%
10 mmol/l Zirkoniumsulfat	16,7%

### Patentansprüche

1. Verfahren zur Bestimmung von Eisen in einer biologischen Probe unter Freisetzung des gebundenen Eisens, Reduktion des freigesetzten Eisens zu  $\text{Fe}^{2+}$ , Zugabe einer Farbreagenzlösung und photometrische Messung des gebildeten Farbkomplexes, dadurch gekennzeichnet, daß die Probe mit einem wasserlöslichen Salz bestehend aus einem Metallkation der III. Haupt- und/oder Nebengruppe versetzt wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Konzentration des Metallsalzes zwischen 0,1 und 50 mmol/l beträgt.
3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß ein Indiumund/oder Scandiumsalz zugesetzt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß weitere Hilfsstoffe zur Stabilisierung oder zur Vermeidung bzw. Reduzierung nicht gewünschter Reaktionen zugegen sind.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß der pH-Wert in der Testlösung zwischen 0 und 3 beträgt.
6. Verwendung von wasserlöslichen Salzen bestehend aus einem Metallkation der III. Hauptund/oder Nebengruppe zur Vermeidung von durch die Anwesenheit von EDTA verursachten Störungen bei der photometrischen Bestimmung von Eisen in einer Probe.
7. Reagenzienkombination zur Bestimmung von Eisen in einer biologischen Probe, dadurch gekennzeichnet, daß ein erstes Reagenz, welches zur Freisetzung des gebundenen Eisens befähigt ist und etwa 0,1 bis 50 mmol/l eines wasserlöslichen Salzes bestehend aus einem Metallkation der III. Haupt- und/oder Nebengruppe aufweist und getrennt davon ein zweites Reagenz, enthaltend etwa 0,5 bis 50 mmol/l Farbstoff, in Form wäßriger Lösungen oder zu deren Herstellung geeigneter Trockengemische.
8. Reagenzienkombination nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß im ersten Reagenz etwa 1% bis 10% (w/v) eines Alkylpolyethylenglykolethers enthalten sind.
9. Reagenzienkombination nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß im zweiten Reagenz etwa 20 bis 200 mmol/l Reduktionsmittel und gegebenenfalls eine das Reduktionsmittel stabilisierende Substanz enthalten ist.
10. Reagenzienkombination nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß das erste Reagenz oder das erste und das zweite Reagenz einen pH-Wert zwischen 0 und 3 aufweisen.
11. Verfahren zur Bestimmung von Eisen in einer biologischen Probe unter Freisetzung des gebundenen Eisens, Reduktion des freigesetzten Eisens zu  $\text{Fe}^{2+}$ , Zugabe einer Farbreagenzlösung und photometrische Messung des gebildeten Farbkomplexes, dadurch gekennzeichnet, daß die Freisetzung des gebundenen Eisens bei einem pH-Wert kleiner 3 erfolgt und eine wasserlösliche EDTA komplexierende Verbindung zugesetzt wird.

Abbildung I





Europäisches  
Patentamt

## EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			EP 99107620.9
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl. 6)
A, D	EP 0343592 A2 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH) 29. November 1989, Zusammenfassung, Patentan- sprüche. ---	1, 7, 11	G 01 N 33/84
A	EP 0306859 A1 (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH) 15. März 1989, Zusammenfassung, Patentan- sprüche. ----	1, 7, 8, 11	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl. 6)
			G 01 N
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt.			
Recherchenort WIEN		Abschlußdatum der Recherche 29-06-1999	Prüfer SCHNASS
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTEN X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschrittliche Offenbarung P : Zwischenliteratur I : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, überein- stimmendes Dokument			

EPA Form 1501 03/87

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT  
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR. EP 99107620.9**

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.  
Die Angaben über die Familiemitglieder entsprechen dem Stand der EPIDOS-INPADOC-Datei am 1. 7. 1999.  
Diese Angaben dienen zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

In Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP A2 343592	29-11-1989	AT E 84894	15-10-1989
		DE A1 381790	20-11-1989
		DE CQ 5890566	29-10-1989
		DE AC 343592	27-06-1990
		EP B1 343592	22-09-1993
		EG T 204535	12-01-1994
		JG B4 202573	29-01-1990
		JP B2 6090207	14-11-1994
		US A 5219760	15-06-1993
EP A1 306859	15-03-1989	DE A1 3729502	23-03-1989
		JP A2 1072070	16-03-1989
		US A 4961970	09-10-1990

Bezüglich näherer Einzelheiten zu diesem Anhang siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamtes, Nr. 12/82.